


塩分摂取の回避にかかる神経活動制御機構

清水秀忠 自然科学研究機構 基礎生物学研究所研究員



Naレベルの感知とニューロン制御の仕組み

Shimizu H, et al: Neuron (2007) 54: 59-72より改変

脳弓下器官にあるグリア細胞は体液Na濃度の上昇を感じ、その情報に基づき抑制性ニューロンの活動を亢進させ、塩分摂取行動を抑制していると考えられる。

*Na⁺/K⁺-ATPアーゼK⁺を細胞内に取り込み、Na⁺を細胞外に排出する酵素。

脱水状態に陥ると動物は、喉の渴きを感じて水分を摂るようになる。一方で、これ以上体液の塩分濃度を上げないために、塩分を避ける。これは、体液のナトリウム(Na)濃度の上昇を感じて塩分摂取を調節するシステムがあるからだ。清水秀忠さんは、塩分摂取の回避にかかるナトリウムチャンネル、Na_xチャンネルの分子機構に迫った。

—Na_xチャンネルについて教えてください。

Na_xチャンネルは、生理的Na濃度を超えた細胞外のわずかなNa濃度上昇を感じて開き、Naを細胞内に流入させます。Na_xは塩分摂取行動の制御にかかる体液Na濃度センサーの役割をしており、Na_xを欠損させたマウスは脱水状態になっても塩分摂取をやめません。

—今回の研究は何を目指していたのでしょうか。

Na_xチャンネルは、脳弓下器官のグリア細胞に存在します。グリア細胞はこれまで神経細胞の補助的役割をしていると想定されていたことから、グリア細胞から神経細胞に、Na濃度が上がったという情報が伝達される仕組みがあるはずだと予想して、その分子機構の解明を目指しました。

—新たにわかったこと。



清水秀忠 (しみず・ひでただ)
基礎生物学専攻。「Na_xチャンネルを発見するグリア細胞による神経活動制御機構」で、2008年3月に長倉研究奨励賞を受ける。

家船研究の歴史の空白を埋める

長沼さやか 人間文化研究機構 国立民族学博物館 外来研究員

「同じ地域に暮らし、同じ言葉を話しながらも、マイノリティ（少数派）とみなされる人々がいます」と長沼さやかさん。2002年から2年間、中国、広東省中山市の農村に滞在しながら、当該地域の「家船」について聞き取り調査を行った。

家船とは船に住む人々のこと、日本や中国南部、東南アジアなどに見られる。中国南部については、中華人民共和国成立後の1950年代から今日まで、政治的な理由から研究されていない。長沼さんは、この歴史の空白を埋め、中国での家船生活の変容を明らかにした。

また、調査を進めるうちに、船上生活をやめて100年以上もたつ人たちが、いまだに「水上人」と呼ばれていることを知り、その社会的背景を明らかにした。陸上人、水上人とは、居住地域が陸上か水上か

の違いだけで定義される単純なものではない。そこには国家の政策など社会的背景が大きく影響しており、長い歴史の中で複雑に形作られてきたものだということが示された。この点で、文化人類学研究の新たな可能性を切り開いたと評価されている。

「自分の足で歩き、自分の言葉で人と接するたびに、新しい発見がありました。それら一つ一つがパズルのようにつながり、全体が明らかになっていく過程は、興味深かったです」と長沼さんは現地調査でなければ得られないものがあると感じている。

水上人というカテゴリーは、これからも地域社会の変化に応じて、変容してゆくことだろう。この研究に終わりはない。

(取材・構成 池田亜希子)



長沼さやか (ながぬま・さやか)
地域文化学専攻。「20世紀中国南部における家船生活の変容に関する研究」で、2008年3月に総研大研究賞を受ける。

高温超伝導体の新たな伝導メカニズムを探る

佐藤宏樹 高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 協力研究員

高温超伝導体は、半導体のように2つのタイプがある。電子(−)をドープするn型超伝導体と、ホール(+)をドープするp型超伝導体である。発見当初、この2つは電荷の符号を変えただけで本質的な超伝導メカニズムは同じなのではないかと考えられていた。しかしここ数年、その仮説では説明できない実験結果が報告されはじめた。

超伝導体には2つの重要な性質がある。電気抵抗がゼロになると、磁場を侵入させない(マイスナー効果)ことである。佐藤さんは、p型と比べ研究が遅れているn型高温超伝導体のうちSr_{1-x}La_xCuO₂(x=0.10～0.15)について、超伝導の電子密度の尺度となる磁場侵入長さを求めた。

実験は陽子加速器のあるカナダ・バンクーバーのTRIUMF研究所において、ミュオンスピンド回転緩和法により行った。これは、ミュオン(μ^+)という磁

場に敏感な素粒子を超伝導体に打ち込み、物質内部の磁場分布を探る方法である。

その結果n型超伝導体はp型に比べてλが短く、超伝導状態の電子密度は従来型の金属超伝導体に近いことがわかった。「高温超伝導体のメカニズムを理解しようとする考え方には、電子どうしが強く反発する絶縁体を出発点に考えるモデルと、通常の金属内で電子が弱く反発しあうモデルがあります。p型は前者のモデルで多く説明されているのに対し n型超伝導は後者のモデルでよく理解できることから、n型・p型で異なる理論的解釈が必要になると思います」と佐藤さん。

n型の超伝導状態がp型とは異なる性質をもつとわかることで、超伝導研究は新たな展開を迎えることになるだろう。



佐藤宏樹 (さとう・こうき)
物質構造科学専攻。「ミュオンスピンド回転緩和法による電子ドープ型銅酸化物高温超伝導体Sr_{1-x}La_xCuO₂の磁束格子状態の研究」で、2008年3月に総研大研究賞を受ける。

(取材・構成 吉戸智明)